

Samenvatting **BMP**

Wechelerveld 2012

9

Esther Veldhoen
estherveldhoen@gmail.com

Intro

In 2012 is het Wechelerveld voor de tweede keer volgens de BMP-methode geteld. Het gebied bestaat overwegend uit bos met allerlei verschillende soorten bomen en ligt ongeveer een kilometer ten noorden van Deventer, vlak na de begraafplaats en het crematorium. Centraal in het gebied ligt een open heidegedeelte. Het geïnventariseerde deel van het gebied bedraagt bijna 49 ha. Het Wechelerveld wordt vooral beheerd om de natuur en recreatiefunctie. Honden mogen er loslopen en dit jaar is ook een mountainbike route aangelegd. De verwachting is dat in de toekomst de recreatieve druk op het gebied alleen maar zal toenemen (mede door de bouw van woonwijk Steenbrugge).

Werkwijze

Er is gewerkt volgens de Handleiding Sovon broedvogelonderzoek (van Dijk en Boele, 2011). In de periode februari t/m juni werden 10 bezoeken afgelegd. De vogels in het gebied zijn op zicht en gehoor gedetermineerd en vervolgens werden de waarnemingen die op broeden of een territorium duiden ingetekend op de veldkaart met afkortingen en symbolen.

Resultaten

In totaal zijn van 38 soorten broedvogels territoria vastgesteld. Opvallend is dat er eigenlijk alleen maar algemeen voorkomende soorten te vinden zijn op het Wechelerveld. De oorzaak ligt

mogelijk in de weinige gelaagdheid van het bos, de algemene soorten zitten voornamelijk in de onderlagen van het bos. Ook ontbreekt vrijwel geheel een struik- en struweellaag waardoor open heideterrein ineens overgaat in opgaand bos.

Omdat er door VWG De IJsselstreek in 2010 ook een BMP telling is uitgevoerd in dit gebied, was er voor het eerst een vergelijking mogelijk. In tabel 9.1 is een overzicht opgenomen van de vogelsoorten en aantal territoria in 2010 en 2012.

In totaal zijn er 45 soorten in deze jaren waargenomen op het Wechelerveld. Over het algemeen zijn de meeste soorten stabiel met een gelijk aantal territoria of normale populatieschommeling.

Onder de soorten bevinden zich 8 soorten waarvan in 2012 geen territoria meer is geteld. Dit zijn soorten die mogelijk slechts 1 jaar in het gebied hebben gebroed of slechts een toevalstreffer zijn geweest tijdens de telling. Dit zijn Boerenzwaluw, Bosuil, Holenduif, Huiszwaluw, Nijlgans, Sperwer, Turkse Tortel en Wielewaal. Van deze soorten waren de dichtheden in het gebied niet groot. Het verlies van de zwaluwen kan verklaard worden dat dit jaar minder bij de boerderijen is geteld dan in 2010. De Sperwer is nog wel in het gebied gezien, maar dit waren geen geldige waarnemingen voor een territorium. Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe soorten in het gebied. Hoewel de aantallen nog gering zijn, zijn dit wel soorten die passen bij het loof- en gemengd bos op het Wechelerveld.

Het gaat hier om Fluitier, Gekraagde Roodstaart, Groenling, Grote Lijster en Ringmus. Tevens zijn bij de vijver/poel nabij de voormalige vuilstortplaats Wilde Eend en Grauwe Gans aangetroffen.

Aanbevelingen voor beheer

In het gebied komen vooral algemeen voorkomende soorten voor. Met name de bosvogels zijn goed vertegenwoordigd. Ten opzichte van 2010 zijn een paar bijzondere soorten verdwenen zoals Bosuil en Wielewaal. Daarvoor in de plaats is wel de Gekraagde Roodstaart in het gebied aangetroffen, welke past bij de combinatie van bos en open terrein. Deze soort en de Boompieper profiteren blijkbaar van het open maken van de heide. Desalniettemin is de overgang van heide naar bos zeer scherp. Er ontbreekt vrijwel geheel een struik- en struweellaag waardoor openheidsterrein ineens overgaat in opgaand bos. De ontwikkeling van een struik- en struweellaag zal bevorderend werken voor diversiteit in vogelsoorten.

Voor de holenbroeders is het van belang dat er voldoende staand dood hout in het bos aanwezig is. Doordat het bos nog niet zo oud is dat er zich via natuurlijke weg holen in de bomen vormen is het aan te bevelen om bijvoorbeeld dikke bomen te ringen. Indien dit niet mogelijk of ongewenst is, kan worden besloten om (soortspecifieke) nestkasten op te hangen. Het is nu de tijd om in te grijpen omdat de groep holenbroeders in aantal terugloopt.

Toekomst

Dankzij onze beheeraanbevelingen is o.a de vereniging "De Groene Knoop" afgelopen herfst al aan de slag gegaan op het Wechelerveld om selectief een aantal bomen te kappen zodat de scherpe overgang van heide naar bos wat vloeiender wordt. Ook zullen er een aantal bomen geringd worden zodat er staand dood hout zal ontstaan.

In 2014 zullen we weer tellen en wie weet wat we dan zullen aantreffen...

Geïnteresseerd in het gehele verslag? Kijk op onze website onder het kopje 'downloads'.

Tabel 9.1: Vergelijking soorten en aantal territoria broedvogels op het Wechelerveld 2010 en 2012, waarbij de rode kleur staat voor een verdwenen soort en de groene kleur voor een nieuwe soort.

Soort	Territoria 2010	Territoria 2012
Appelvink	1	1
Boerenzwaluw	3	0
Bonte Vliegenvanger	2	2
Boomklever	5	5
Boomkruiper	8	14
Boompieper	1	3
Bosuil	1	0
Fitis	5	5
Fluiter	0	1
Gaai	3	2
Gekraagde Roodstaart	0	2
Glanskop	4	3
Goudhaan	3	1
Grauwe Gans	0	1
Grauwe Vliegenvanger	3	5
Groenling	0	2
Grote Bonte Specht	8	11
Grote Lijster	0	2
Heggenmus	2	1
Holenduif	1	0
Houtduif	21	10
Huismus	6	1
Huiszwaluw	3	0
Kleine Bonte Specht	3	2
Koolmees	22	22
Kuifmees	2	2
Matkop	1	1
Merel	33	26
Nijlgans	1	0
Pimpelmees	19	20
Ringmus	0	1
Roodborst	23	29
Sperwer	1	0
Spreeuw	4	2
Staartmees	3	2
Tjiftjaf	18	23
Tuinfluiter	4	7
Turkse Tortel	1	0

Soort	Territoria 2010	Territoria 2012
Vink	25	24
Wielewaal	1	0
Wilde Eend	0	1
Winterkoning	27	29
Zanglijster	14	9
Zwarte Kraai	5	3
Zwartkop	20	25



Afbeelding 9.1 Heggenmus.